



250 MEG FARM средство для обработки вымени перед доением с молочной кислотой

Концентрированное средство с антибактериальным эффектом для мойки вымени перед доением, для замачивания и стирки многоразовых текстильных салфеток. Способствует заживлению мелких ран и трещин на коже вымени сосков животного.

Назначение

✓ НАЗНАЧЕНИЕ

- Для обработки вымени сельскохозяйственных животных перед доением
- Для замачивания и стирки многоразовых текстильных салфеток
- Может использоваться для мытья животных

☰ СВОЙСТВА

- Средство является концентратом;
- Обладает высоким очищающим эффектом, снижая бактериальную обсемененность вымени и сохраняя высокие органолептические показатели молока;
- Не оказывает раздражающего воздействия на кожу вымени;
- Способствует заживлению мелких ран и трещин на коже вымени сосков животного;
- Для круглогодичного применения.

🕒 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В виде спрея
Протирание
Окунание
Замачивание и стрика

⌚ СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, глицерин, молочная кислота, функциональные добавки.

▣ ФАСОВКА

5 л | 10 л | 20 л

pH pH: 5,5- 6,5 (1% р-р в дистиллированной воде)

Декларация РОСС RU Д- RU .AA80.B.00373/18
ТУ 20.20.14-001-28737819-2018

Способы применения

Перед обработкой рекомендуется ополоснуть вымя животного водой

ОБРАБОТКА ВЫМЕНИ

В виде спрея:

Рекомендуемая концентрация 5-10%. Разбрьзгивать раствор на вымя с помощью распылителя. Насухо протереть

салфеткой.

Протирание:

Рекомендуемая концентрация 0,3-0,5%. Салфетку смочить в растворе, обработать вымя. Одно вымя обрабатывается одной салфеткой. Использованную салфетку не применять для обработки вымени другого животного.

Окунание:

Рекомендуемая концентрация 2-10%. Заполнить специальный пенообразующий стаканчик раствором, создать обильную пену несколькими нажатиями на мягкую часть стаканчика. Методом окунания нанести пену на соски. Через 15-30 секунд удалить остатки пены с помощью влажной салфетки или ополоснуть водой.

Замачивание и стирка салфеток:

Салфетки многоразового использования после применения замачиваются и стираются в 1% растворе средства (100 мл средства на 10 л воды).

ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



① ОБРАБОТКА ПЕРЕД ДОЕНИЕМ → ② ОБРАБОТКА ПОСЛЕ ДОЕНИЯ

250 MEG FARM средство для обработки вымени перед доением с молочной кислотой

350 MEG FARM средство для обработки вымени после доения с хлоргексидином